

3. Calendrier vaccinal 2011 – Tableaux synoptiques

3.1 Tableau des vaccinations recommandées chez les enfants et les adolescents en 2011

	Vaccins contre	Naissance	2 mois	3 mois	4 mois	12 mois	16-18 mois	2 ans	6 ans	11-13 ans	14 ans	16-18 ans	
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES	Diphthérie (D), Tétanos (T) Polio		DT Polio	DT Polio	DT Polio		DT Polio		DT Polio ¹	DT Polio		dT Polio ²	
	Coqueluche acellulaire (Ca)		Ca	Ca	Ca		Ca			Ca			
	<i>Haemophilus influenzae b</i> (Hib)		Hib	Hib	Hib		Hib						
	Hépatite B (Hep B)		Hep B		Hep B		Hep B						
	Méningocoque C (vaccin conjugué)												
	Pneumocoque (Pn conj)		Pn ³ conj		Pn conj	Pn conj							
	Rougeole (R) Rubéole (R) Oreillons (O)						1 ^{ère} dose (à 9 mois si collectivité)	2 ^{ème} dose entre 13 et 24 mois (de 12 à 15 mois si collectivité)					
	Papillomavirus humains (HPV)											3 doses selon le schéma 0, 1 ou 2 mois, 6 mois (filles)	
	Coqueluche acellulaire (ca)												1 dose dTcaPolio ⁴ si non vacciné à 11-13 ans
	Hépatite B												
RATTAPAGE	Méningocoque C (vaccin conjugué)												
	Papillomavirus humains (HPV)												
R R O													
POPULATIONS PARTICULIÈRES ET À RISQUE	BCG												
	Grippe												
	Hépatite A												
	Hépatite B		Nouveau-né de mère Ag HBs positif ¹ ; 3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois									3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois si risques ¹²	
	Méningocoque C (vaccin conjugué)												
	Méningocoque ACYW135												
	Pneumocoque		1 dose de Pn conj à 2, 3 et 4 mois	Si risque ¹⁵ :								Si risque à partir de 5 ans ¹⁷ : 1 dose de Pneumo 23 tous les 5 ans	
	Varicelle												
													2 doses chez adolescents ¹⁹ de 12 à 18 ans sans antécédent et sérologie négative (sérologie facultative)

Nota bene : les vaccins indiqués sur fond rose existent sous forme combinée.