

IMPETIGO

Agent pathogène	Streptocoque groupe A <i>Streptococcus pyogenes</i>	Staphylocoque doré <i>Staphylococcus aureus</i>
Réservoir	Homme malade	Homme malade
Source de contamination	lésions cutanées	lésions cutanées matériel contaminé
Mode de contamination <i>E</i> : à partir de l'environnement <i>P</i> : de personne à personne	<i>P</i> : par contact direct avec une lésion cutanée	<i>P</i> : - par contact direct avec une lésion cutanée <i>E</i> : par contact indirect avec du matériel contaminé (linge ...) transmission possible par des mains souillées
Période d'incubation	1 à 10 jours	1 à 10 jours
Importance de la contagiosité	Moyenne	Faible
Durée de la contagiosité	Jusqu'à 48 h après le début de l'antibiothérapie	Jusqu'à 48 h après le début de l'antibiothérapie
Population particulièrement exposée	nourrissons	nourrissons
Population présentant un risque de gravité	Immunodéprimés	Immunodéprimés
MESURES A PRENDRE DANS LA COLLECTIVITE		
Eviction	Non, si lésions protégées Oui pendant 72 h après le début de l'antibiothérapie, si les lésions sont trop étendues et ne peuvent être protégées	Non, si lésions protégées Oui pendant 72 h après le début de l'antibiothérapie, si les lésions sont trop étendues et ne peuvent être protégées
Mesures d'hygiène	Renforcement des mesures d'hygiène	Renforcement des mesures d'hygiène
Mesures préventives	Couverture des lésions par pansement	Couverture des lésions par pansement